T2K実験における重いニュートリノ探索

arXiv:1212.1062. JHEP1303(2013)125.

渡邊 篤史
(京都産業大学益川塾)

共同研究者：浅賀岳彦 (新潟大学)
永島伸多郎 (EPFL, Lausanne)

2014年11月9日@日大理工・益川塾連携素粒子物理学シンポジウム

重いニュートリノ

このトークでは、質量が $1 \text{ MeV} \sim 500 \text{ MeV}$ の重いステライルニュートリノに着目する

ステライルニュートリノ：普通のニュートリノと同じ量子数を持ち、弱く混合している粒子

$$\nu_\alpha = U_{\alpha i} \nu_i + \Theta_\alpha N$$

弱い相互作用の固有状態
 $\alpha = e, \mu, \tau$

牧・中川・坂田
行列

質量の固有状態
 $i = 1, 2, 3$

$\Theta_{\alpha i} \ll 1$

このようにニュートリノと混合する中性レプトンは、標準模型の拡張に頻繁に登場する

例) シーソー機構

標準模型に、ゲージ無色の
フェルミオンを導入する

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} = Y_e \bar{L} e_R H + Y_\nu \bar{L} \nu_R H^* + \frac{1}{2} M \nu_R \nu_R + \text{h.c.}$$

$$\mathcal{M} = \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \nu_L & \nu_R \end{array} \\ \begin{array}{c} \nu_L \\ \nu_R \end{array} & \left(\begin{array}{cc} 0 & m_D \\ m_D & M \end{array} \right) \end{array} \quad m_D \ll M \quad \text{なら} \quad \begin{array}{l} m_\nu \simeq \frac{m_D^2}{M} \\ m_N \simeq M \end{array}$$

$$\nu_L \simeq \nu + \frac{m_D}{M} N$$

典型的な右巻きニュートリノの質量スケールは、

$$M = \frac{m_D^2}{m_\nu} = \frac{(100 \text{ GeV})^2}{0.1 \text{ eV}} = 10^{14} \text{ GeV}$$

いろいろなステライルニュートリノ

典型的な「スーパーヘビー」シナリオ以外にも、
軽い質量の場合も現象論的におもしろい

- eV ステライルニュートリノ ⇒ modified neutrino oscillation
- keV ステライルニュートリノ ⇒ ダークマター候補
[Dodelson,Widrow,1994; Shi,Fuller,1999; Dolgov,Hansen,2002;….]
- パルサーキック、超新星爆発
[Kusenko,Segre,1997; Fuller,Kusenko,Mocioiu,Pascoli,2003; ….]
- バリオン数生成
[Akhmedov,Rubakov,Smirnov,1998]
- ν MSM
[Asaka,Blanchet,Shaposhnikov,2005]

これまでの実験からの制限

140 MeV < M < 500 MeV の領域では、PS191(1984)の制限が最も強い

T2K実験における重いニュートリノ探索

なぜT2K?

140 MeV < M < 500 MeV の領域では、PS191(1984)が最強

PS191 : beam dump 実験

	PS191	T2K	MINOS	MiniBooNE	SciBooNE
POT	0.86×10^{19}	10^{21}	10^{21}	10^{21}	10^{21}
(Distance) ⁻²	$(128 \text{ m})^{-2}$	$(280 \text{ m})^{-2}$	$(1 \text{ km})^{-2}$	$(541 \text{ m})^{-2}$	$(100 \text{ m})^{-2}$
Volume	216 m^3	88 m^3	303 m^3	524 m^3	15.3 m^3
Events	1	9.9	2.7	15.8	13.5

T2K

茨城県東海村のJ-PARCから、岐阜県神岡の
Super Kamiokande にニュートリノ飛ばす

- $E_p = 31 \text{ GeV}$
- off-axis $\Rightarrow$ ニュートリノのエネルギーを、低エネルギーに絞る

重いニュートリノNの生成、検出過程

以下では、 K^+ のみに注目する

重いニュートリノのフラックス

← $K^+ \rightarrow \mu^+ N$ のみの場合

- 質量が、350, 300, 200, 100, 50 MeV の場合
- 点は、 $|\Theta|^2 \times v_\mu$ のフラックス

↓ $K^+ \rightarrow e^+ N$ のみの場合

ナイーブな予想 「 $|\Theta|^2 \times v_\mu$ のフラックス」よりも、質量が大きくなると低エネルギーで大きくなる

- カイラリティ抑制 (増幅)
- Phase space の効果

2体崩壊のモードからの制限

- 赤の実線は、PS191の制限(90%CL)
- 青の実線は、ゼロイベント、ゼロバックグラウンドのときの90%CLでの排除領域
- 青の点線は、 $V = 9 \text{ m}^3$ の場合 (Full volume は 61.25 m^3) $\Rightarrow$ 次のスライド

バックグラウンドに対するコメント

アクティブニュートリノの相互作用

~7300 イベント/10²¹ POT/ton

[Karlen'05]

- μ^{-} と π^{+} の運動量の不変質量分布

⇒ シグナルは重いニュートリノの質量のところで鋭いピーク。バックグラウンドはなだらかな分布 (?)

- イベントを、TPCのアルゴンガス中で起きるものに限定すれば、バックグラウンドを抑えられる

~80 イベント/10²¹ POT

- ν_e は ν_{μ} よりおよそ2桁少ないので、 $N \rightarrow e^{-} \pi^{+}$ は有望

3体崩壊モードからの制限

- $N \rightarrow e^- e^+ \nu$ は、 π^0 の崩壊がバックグラウンドとなる．他に比べて有望ではない
- $N \rightarrow \mu^- e^+ \nu$ に対しては、 ν_μ のCCからできるDメソンのsemi-leptonic decayがあるが、T2Kでは高エネルギーのニュートリノは少ないのでこれはあまり起きない
- $N \rightarrow \mu^- \mu^+ \nu$ も有望

* チャームの生成断面積は、全断面積の1% (4%) @5GeV (15GeV)

Summary

質量が 1 MeV から 5 0 0 MeVの重いニュートリノの、
T2K実験での detectability を調べた

- T2Kは過去最強のPS191と比べて同等もしくはそれ以上(とくに $N \rightarrow e^- \pi^+$)
- Kaon由来のフラックスの計算において、重いニュートリノの質量 ($M_N > 100 \text{ MeV}$)の効果はかなり重要. $\Phi_N \neq |\Theta|^2 \Phi_\nu$
- 大気中での生成 + SKでの検出も、補助的な役割をはたすかも

Backup

混合は大きくなり得るのか？

ナイーブには・・・

$$\mathcal{M}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & m_D \\ m_D & M \end{pmatrix} \quad m_\nu = \frac{m_D^2}{M} \quad \Theta \simeq \frac{m_D}{M}$$

$$\Theta^2 = \frac{m_\nu}{M} = 0.5 \times 10^{-10} \left(\frac{\text{GeV}}{M} \right)$$

因みに湯川結合は

$$y_\nu = \frac{\sqrt{m_\nu M}}{v} \sim 4 \times 10^{-8} \left(\frac{M}{\text{GeV}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

ただし2世代以上の場合には・・・

$$m_\nu = \sum_i m_{D_i} m_{D_i}^T \frac{1}{M_i}$$

複数の寄与の間でキャンセルが起こり、固有値が小さくなる場合がある

例えば、

$$\mathcal{M}_\nu = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ \hline a & b & 0 & M \\ 0 & 0 & M & 0 \end{array} \right) \quad \longrightarrow \quad m_\nu = 0$$

e.g., グローバルなU(1)

	ν_{R_1}	ν_{R_2}	l	e_R
U(1)	q	$-q$	q	q

[Shaposhnikov'06]

ニュートリノ質量には寄与しないが、ニュートリノと大きな混合をもつ中性レプトンが存在する場合もある

ニュートリノ質量 ← シーソー機構

alternative

対称性の破れ
時空の幾何
radiative
...

フラックスの計算

p + C 散乱におけるメソンのスペクトラム、
ホーンによる運動量の変化、
ビームライン、検出器の3Dジオメトリー ...

本格的な計算は、
非常に複雑

T2K collaboration による active neutrino のフラックスの
シミュレーションの結果を出すように、親の K^+ のフラックスを
モデリングする

その K^+ のフラックスをつかって、検出器に入ってくる N の数を
(単純化されたジオメトリーに基づいて)計算する

アクティブニュートリノのフラックス

アクティブニュートリノのソース項

$$S_\nu(E_\nu, \theta, \phi, l) = \int_0^\infty dp_K \frac{\phi_K(p_K, l)}{\beta(1/\Gamma)\gamma} \frac{1}{\Gamma} \frac{d^3\Gamma}{dE_\nu d\cos\theta d\phi}$$

Kのスペクトラム

崩壊長

エネルギー・角度分布

アクティブニュートリノのフラックス

$$\phi_{\nu_\mu}(E_\nu) = \int_0^{l_f} dl \int_{-1}^1 d\cos\theta \int_0^{2\pi} d\phi \frac{1}{A} S_\nu(E_\nu, \theta, \phi, l) P(\theta, \phi),$$

検出器の張る面積

射影関数

重いニュートリノのソース項

$$S_N(E_N, \theta, \phi, l) = \int_0^\infty dp_K \phi_K(p_K, l) \left(\frac{m_K}{p_K} \right) \sum_{i=1}^2 \frac{d^3\Gamma_i}{dE_N d\cos\theta d\phi},$$

[Abgrall'11]

検出器での崩壊イベント

$$\text{Events} \simeq \int_{M_N}^{\infty} dE_N \phi_N(E_N) \frac{V}{\lambda},$$

ND280 の体積

注目する崩壊モードの崩壊長

まずはPS191との比較の為に、

- N は Dirac
- Nの3体崩壊における NCの効果は無視する
- Nの生成において、 $K^+ \rightarrow \mu^+ N$ または $K^+ \rightarrow e^+ N$ のどちらか一方がドミナント

の単純化の下で解析をする

Atmospheric heavy neutrinos

The main production processes

$$\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm N$$

$$\mu^\pm \rightarrow e^\pm \nu_e (\bar{\nu}_e) N$$

for

$$M_N < m_\pi - m_\mu \approx 35 \text{ MeV}$$

$$M_N < m_\mu - m_e \approx 105 \text{ MeV}$$

検出過程は $N \rightarrow e^- e^+ \nu$

Two fuzzy rings

Atmospheric heavy neutrinos

$\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ がバックグラウンド

Invariant mass

$$\begin{aligned} & (p_{e^-} + p_{e^+})^2 \\ &= (q - p_\nu)^2 \\ &= M_N^2 - 2qp_\nu \\ &= M_N^2 - 2M_N E_\nu \\ &\approx \frac{1}{3} M_N^2 \end{aligned}$$

$\langle E_\nu \rangle \simeq \frac{1}{3} M_N$

[Nakayama, 2003]

1489 days data of Super-Kamiokande

Atmospheric heavy neutrinos

- Upper bound of the mixing: $|\Theta_\mu|^2 < 10^{-4}$ for $20 \text{ MeV} < M_N < 80 \text{ MeV}$
- Though it is weaker than the present accelerator bound, further data accumulation is interesting

Θ_τ について

Θ_τ は、生成には現れないが、崩壊過程にNCの寄与を通じて効く

Θ_τ は、 π や K の崩壊には現れないので、 Θ_e や Θ_μ に比べて制限は弱い

例えば...

$$|\Theta_e|, |\Theta_\tau| \gg |\Theta_\mu| \quad \text{かつ} \quad M_N > 211 \text{ MeV}$$

$$\Rightarrow |\Theta_e| \sqrt{|\Theta_e|^2 + |\Theta_\tau|^2} \quad \text{に対する制限}$$

e.g., $300 \text{ MeV} < M_N < 400 \text{ MeV}$ で $|\Theta_e|^{-4.5}$, $|\Theta_\tau|^{-2.5}$

$$\Rightarrow N \rightarrow \mu\text{-}\mu^+\nu \text{ も } N \rightarrow e\text{-}\pi^+ \text{ もみえる}$$

重いニュートリノの相互作用

ゲージ相互作用

普通のニュートリノと同様だが、混合によって抑制される

湯川相互作用

$$m_D \ll M \rightarrow \Theta \simeq \frac{m_D}{M} = \frac{y_\nu v}{M}$$

EWより軽いステライルニュートリノでは無視できる

主な検出ストラテジー

●メソンの崩壊における kinematics

$$\begin{array}{ll} \pi^\pm \rightarrow \mu^\pm N & K^\pm \rightarrow \mu^\pm N \\ \pi^\pm \rightarrow e^\pm N & K^\pm \rightarrow e^\pm N \end{array}$$

$$E_l = \frac{m_{\pi/K}^2 + m_l^2 - m_N^2}{2m_{\pi/K}}$$

●崩壊をみる

$$N \rightarrow e^- e^+ \nu, N \rightarrow e^\pm \pi^\mp, N \rightarrow \mu^\pm \pi^\mp, \dots \text{ etc.}$$

●衝突実験 (Belle, BaBar, Tevatron, LHC, ...)